

### 9.3.1 Hazen ver-jagen

Hazen (📖 *Lepus europaeus*) richten in de tuin minder schade aan dan konijnen omdat ze niet in groep leven en geen holen graven. Een konijn blijft in de buurt van zijn hol, een haas is een zwerver die verder trekt. Als je ze vangt of schiet, druk dan eerst de blaas leeg (van borst naar aars) voor je ze meeneemt.

Hazen kunnen in de winter wel de bast van (jonge) bomen schillen.

Een haas is veel groter en heeft lange, brede oren met zwarte punt. Met zijn langere poten kan hij rechtop zitten. Als een konijn wegloopt (tot 55 km/u) zie je de witte onderkant van de staart opwippen. Bij de haas (tot 75 km/u) is de bovenkant van de staart donker. Hij houdt zijn staart omlaag tijdens het lopen. Hazen leven niet in holen, maar in 'legers', rustplekken op de grond met de vegetatie als windscherm.

♪ *Hoe vangt een Hollander een haas? Hij kruipt achter een struik en fluit als een wortel.*

*JW van Besouw*

♪ *'Waar naartoe, mijnheer Stegen?' 'Hazen jagen.' 'Waar ga je ze naartoe jagen?'*

*Theo Bergsma*

### 9.3.2 Konijn: knaagtand niet plezant

**Konijnen** (📖 *Oryctolagus cuniculus*) horen bij de haasachtigen (Lagomorpha), niet bij de knaagdieren.

Als konijnen mijn groenten mogen opeten, vind ik dat ik ook konijn mag eten.

Wil je ze weghouden, gebruik dan een dichte omheining en controleer geregeld op gegraven gangen. Waar de konijnen niet zo van houden: akelei (*Aquilegia vulgaris*), Italiaanse ossetong (*Anchusa*), blauwe distel (*Eryngium*), irissen, kattenkruid (*nepeta*), zeepkruid (*Saponaria officinalis*), kleine Thijm (*Thymus vulgaris*), Jacobs kruiskruid (*Jacobaea vulgaris*), zeedistel (*Eryngium maritimum*) en stalkruid (*ononis natrix*), salamonszegel (*polygonatum*), maagdenpalm, digitalis...

♪ *'Een konijnenpoot een geluksbrenger?  
Toch niet voor het konijn zelf...'* R.E. Shay