

10.2 TE LAND - ree, gebraad, ragout...

De ree (📖 *Capreolus capreolus*) is een vrij veel voorkomende kleine hertachtige met een schofthoogte van 63 tot 67 centimeter. De kop-romplengte is 95 tot 140 centimeter, ze wegen 16 tot 35 kilogram.

Ze hebben een zandgele tot roodbruine zomervacht, 's winters is die donkerder en grijs. Volwassen dieren hebben geen stippen. Ze hebben een witte tot gelige rompvlek en een cirkelvormige witte vlek op hun achterste: de spiegel 📖.
De neus is zwart, en de kin is wit.

De ree wordt maximaal twintig jaar, maar in het wild meestal slechts zeven of acht jaar oud.

De reebok is iets groter dan de geit en heeft een eenvoudig gewei 📖, maximaal 25 centimeter met hoogstens drie punten, nooit meer dan 2 zijtakken per stang 📖. (Bij herten spreken we van bok en hinde.) Niet altijd, maar vaak (afhankelijk van voeding ed.) is het gewei van een reebok, en ook zijn benaming, typisch: een spiesbok 📖 (1 jaar) heeft 2 stangen, het volgende jaar heet hij een gaffelbok 📖 (1 zijtak) en daarna een zesender 📖 (2 zijtakken).

Het gewei bestaat niet uit hoorn 📖 maar uit massief been 📖. Het wordt ieder jaar in de winter opnieuw gevormd en is dan bedekt door een zachte behaarde huid (bast). De basthuid wordt aan takken afgeschuurd tussen maart en juni.
De oudere bokken doen dit vroeger (februari/begin maart), de jongere bokken later. Tussen oktober en januari wordt het gewei afgeworpen.

De ree is een selectieve planteneter. Het grazen wordt laveien 📖 genoemd. Tussen eten en herkauwen zit meestal één (in de zomer) tot twee uur (in de winter). De knabbelaar eet vooral de licht verteerbare en meest voedzame groeipunten van bramen, scheuten, bessen, twijgen, knoppen en loten van struiken en bomen, kruiden, grassen, bladeren, noten, paddenstoelen, granen, landbouwgewassen enz..

In de herfst eten ze ook eikels.

In de winter gebruikt hij 30-40% minder voedsel, maar vooral knoppen en twijgen. Het aantal foerageerperioden is dan gehalveerd en ze zijn aanzienlijk minder actief.

Reeën leven over het algemeen solitair. Een troep reeën heet een sprong 📖.

's Winters kan er kuddevorming zijn, met wintersprongen van 3 tot 8 stuks.

De ree is in de schemering actief, en van september tot april voornamelijk 's nachts.

Ze loopt snel maar heeft weinig uithoudingsvermogen. Ze springen en zwemmen goed.

Bij meerdere dieren uitgestelde zwangerschap (📖 diapauze, verlengde draagtijd of uitgestelde innesteling voor waarbij de vroege celdeling stopt en pas verder gaat op in functie van een gunstige periode voor de geboorte. Hermelijn, steenmarter, das, vleermuis, beer gebruiken dit, en maar één hert: de ree.

Als enige evenhoevige 📖 heeft de ree een verlengde draagtijd. Bronsttijd en paring zijn in juli en augustus, maar pas eind december, na 150 dagen, komt het embryo tot ontwikkeling. Nog zo'n 144 dagen later wordt eind mei, begin juni het kalf geboren.

Geiten die in de zomer niet drachtig waren worden in oktober een tweede keer bronstig. Zij hebben dan geen verlengde draagtijd, hun kalveren worden dus rond dezelfde tijd geworpen.

Driekwart van alle worpen zijn tweelingen. Het jong weegt bij de geboorte 1,3 tot 2,3 kilogram en heeft een bruinig zwarte vacht met rijen witte vlekken op de rug en de flanken. Op de bovenlip zie je een zwarte snor. Na zes weken vervagen de vlekken, in oktober zijn ze weg.

De zoogtijd duurt zes tot tien weken. Jonge kalveren worden zo'n zes tot tien keer per dag enkele minuten gezoogd, oudere kalveren slechts twee tot drie keer per dag. De rest van de tijd zijn de kalveren alleen, maar niet verlaten. De ree blijft altijd in de buurt. Tweelingen worden apart van elkaar gezoogd, zo'n twintig meter uit elkaar. Reekalfjes blijven de eerste 10 dagen in dekking en verplaatsen zich bijna niet. De natuurlijke vijanden zijn loslopende honden, de vos en het everzwijn. Minder natuurlijke: mensen, verkeer, bebouwing, grasmaaiers...

De slaapplek is een kleine, vage kuil, een woelplek.

De ree maakt gebruik van wissels 📖: regelmatig of veelvuldig belopen paadjes.

De hoefafdrukken van de ree zijn 3-4 cm breed, de lengte is 4,5 cm of meer. Inclusief de bijhoeven zijn de prenten tot 7 cm lang. De afstand tussen afdrukken kan tot 140 cm zijn als de ree in draf loopt.

🎵 *De dichter, arm als hij is, moet zuinig zijn met woorden. William Griffith*

Het verschil tussen een **ree** en een **hert**



Er zijn veertig soorten, 16 geslachten en vier onderfamilies herten 📖.

De mannetjes dragen een gewei dat ze jaarlijks afwerpen. Een nieuw gewei wordt meestal groter en complexer dan het vorige. Er is geen vast verband tussen leeftijd en gewei.

In de Benelux komen

- 🌿 het edelhert 📖 (grootste, tot 250 kg en 140 cm schofthoogte),
- 🌿 het damhert 📖 (zeldzaam, tot 130 kg en 90 cm schofthoogte) en
- 🌿 de ree (kleinste, tot 30 kg en 67 cm schofthoogte) voor. Edelherten en damherten leven vaak in groep. In natuurgebied Stramprooierbroek in Kinrooi is er al een kudde van 25.

Na het afschuren van het **gewei** is het gelige wit van bot te zien. Bij reeën wordt het gewei donkerder, bij edelherten blijven de punten wit.

Kenners herkennen een hert aan het gewei, zelfs na wisseling(en). Aan de geweivorm zien ze ook de herkomst (land(streek)).

Het gewei van ons grootste inlandse zoogdieren staat rechtop en vertakt zich enkelvoudig. Naar het aantal vertakkingen spreken we van een 1: edelhert, 2: spieshart, 4: gaffelhert. 6: zesender, 8: achtender, 10: tienender.



Een damhart heeft tot 6 vertakkingen, waarvan de laatste twee bladvormig zijn. De reebok heeft een eenvoudig gewei van ongeveer 25cm met maximaal 3 takken per stang.

De staart van de ree is zeer klein en valt alleen op als een ree zijn behoefte doet.

Verschil tussen hoorn en gewei



Een gewei zijn 2 voorhoofsbeenderen van manlijke herten. (Alleen bij het rendier heeft een vrouwtje ook een gewei.) Het gewei bestaat uit vertakt, kaal bot. Het voelt koud aan en is levenloos. Het wordt ieder jaar opnieuw gevormd. Gewei kan na verhitten (koken, stomen) vervormd worden. Gewei is minder breekbaar dan bot.

Hoorn  is het harde materiaal van hoeven, snavels, nagels en de buitenkant van hoorns. Het bestaat hoofdzakelijk uit het taaie, onoplosbare eiwit keratine ( haar). Een `hoorn` bestaat uit een levende beenpit met er omheen lederhuid en opperhuid met een dode hoornlaag of samengeperst haar. De holten in de beenpit staan in verbinding met de neusholten.

Hoorns zijn puntig en kunnen recht, gebogen of gedraaid; glad of met ribbels zijn. Ze zijn blijvend, en niet vertakt.

Om een hoorn te bewerken moet je eerst de kern er uit halen. Dat kan nadat je hem 3 maanden begraven hebt (markeer de plek!), of na licht koken, wat voor kwaliteitsverlies van de hoorn zorgt. Beide methoden stinken. Daarna vaak, zelfs weken lang, spoelen, weken, schrapen en schuren en polijsten. Voor een beker kan je de punt recht afzagen en er een houten bodem in persen en spijkeren. Je kan lepels, vorken, kammen, handvatten, (sneeuw)brillen... maken. Dun geschuurde 'glazen' ruitjes werden voor stormlantaarns gebruikt.

Om hoorn (traag recht) te buigen moet hij in heet, net niet kokend water weken. Daarna fixeren en laten drogen en afkoelen.

De hoorn van de neushoorn is puur keratine. Ook de giraf heeft een wat afwijkende vorm. De `hoorn` van een narwal is een slag tand.

Been, gewei en ivoor bestaan uit een anorganische component (vezelachtige proteïne collageen) voor hardheid en een organisch deel (kalkzouten hydroxyapatiet) voor elasticiteit en stevigheid. De verhoudingen verschillen voor ieder van de drie. Ivoor en gewei kan je door verhitten (uren koken, of stomen) buigen en vastgeklemd in vorm laten uitharden. Ivoor bestaat net als tand uit dentine, maar heeft geen glazuur.

🎭 Dichter: slaapwandelaar in het woordenboek. Karel Jonckheere