


### 11.2.1 Steenmarters: overlast

De **steenmarter** of fluwijn ( Martes foina) heeft een bruine vacht met een witte keelvlek die gevorkt doorloopt tot de bovenpoot. Hij wordt doorgaans 3, maximum 10 jaar in het wild (in gevangenschap tot 18 jaar). Het lijf wordt 40-48 cm lang met een (pluim) staart van 26 cm. Gemiddeld is hij 12 centimeter hoog en weegt 1,3 tot 2,5 kilogram.


Behalve in steengroeven en rotspartijen leeft hij vaak vlakbij de mens (typische cultuurvolger), in huizen, op de zolder of in een spouwmuur, in stallen en schuren. Soms graaft hij ook een hol in de grond. Steenmarters hebben meerdere dagrustplaatsen, en leven vooral 's nachts. Ze lopen dan tot 8 km. In hun territorium (in steden ca 40 ha, daarbuiten tot 200 ha.) dulden ze geen soortgenoten.

De steenmarter laat zijn uitwerpselen achter in een latrine (steeds dezelfde plek, niet ver van zijn hol,.. of nest).

#### Verschil steen- en boommarter:



Steenmarter: witte, gevorkte bef, witte ondervacht, kleinere, laaggeplaatste oren

Boommarter : geeloranje bef, grijsbruine ondervacht, langere, bredere oren

Ze kunnen overlast veroorzaken door stank van hun latrines of kadavers, lawaai (stoeiende jongen) en knaagschade aan bv. isolatiemateriaal, ook aan bekabeling in auto's. Onderzoek heeft achterhaald dat het dan gaat om kabelisolatie waarin beendermeel is verwerkt.

De paring heeft plaats in de zomer, na de bevruchting vindt er een kiemrust plaats, na een uiteindelijke draagtijd van 9 maanden worden er 2-5 jongen geboren (een worp per jaar).

Vooraf muizen en ratten staan op het menu, maar ook eieren, amfibieën en reptielen, vogels, mollen en insecten. Bij schaarste ook bessen en andere vruchten.

Steenmarters worden vaak bestempeld als echte kippendoders. Onderzoek toont dat ze vaak eieren stelen, maar van de kippen afblijven. Bunzing of nerts echter niet. De steenmarter profiteert wel van hun ravage. Kip is zelden tot nooit gevonden bij maagonderzoek.

In de latrine zie je typerende zoetig ruikende keutels die net gevlochten vezels of haren lijken.

Hij maakt krabsporen op hout en op stenen wanden.

Hij kan eieren en prooi meeslepen op daken en over hekken.

Hoektandafstand 10-13 mm.