

Afgeknipte veren van een prooi vind je niet op de grond, maar op hoger gelegen posities. Vaak blijven grote delen afgekauwd achter. In tegenstelling tot de vos, eet hij vleugels, schoudergordel etc. niet op.


Marter en katten laten nagelsporen na op botten, vossen nooit.

Bij overlast kan je ze (samen met de jongen) (met lawaai) verjagen, en dan alle gaten dichten en toegangsmogelijkheden elimineren. (Want ze komen terug.) Denk aan takken en klimrekjes tegen de gevel, bomen (voorzie een kraag).

Stroomdraden en vieze geurtjes als ammoniak, schaaltee bleekwater of toiletblok met sterke citroengeur kunnen uitkomst bieden.

Autobekabeling kan je voorzien van een kabelhuls.

11.2.2 **Boommarter: zeldzaam en schuw**

Boommarter ( *Martes martes*) zijn typisch nachtdieren van 36-58 cm. lang, 15 cm hoog en 500 tot 2.200 gram zwaar. De staart is 17 tot 28 centimeter lang. Ze zijn schuw en zeldzaam.

Je vindt ze in oude bossen met veel holtes in (specht-) of onder bomen, waar ze met gemak van tak naar tak springen. Boommarters hebben in hun woongebied meerdere hollen. Ze gebruiken ook verlaten nesten van eekhoorns of duiven.

Ze paren in de zomer en hebben een draagtijd met kiemrust van 8-10 maanden. Het moertje heeft rond april een worp per jaar met meestal 3 jongen.

Ze eten insecten, slapende en jonge vogels, eieren, kleine zoogdieren (eekhoorn, muis) en aas.

Boommarters hebben latrines in bomen, met drollen als van de steenmarter, vaak met paarse schildjes van mestkevers.

De scherpe nagels maken op beuken krabsporen.

♫ Lector: incontinent insect. Tom Lanoye