


Hierbij hoort ook ontwormen en hoeven knippen. Met een snoeischaar en/of een mesje knip je alle losse stukken weg. Houdt gekleurde en witte wol apart.

Van de 1,5 miljoen kilo wol die Nederlandse schapen jaarlijks produceren gaat 95% de verbrandingsoven in sinds (2021) de transportkosten naar China te hoog werden. Het Hollands Wol Collectief probeert er isolatie en kleding van te maken.

14.4.11.9 Geit: melk en vlees, wereldwijd

De bezoargeit ( *Capra aegagrus*) wordt gezien als voorouder van de gedomesticeerde geit.

Geiten zijn ook alleseters. Ze eten zelfs papier. Kijk dus uit waar ze bij kunnen. Je hebt een goede omheining nodig. Ze breken graag uit. En eten dan je groentetuin kaal. Of die van je burens. Ze knagen de schors van (vooral jonge) bomen.

Een lam wordt ca. 3 maanden gezoogd. Een melkgeit kan 10 maanden gemolken worden. Twee maanden voor de volgende worp staat ze droog. Daartoe verminder je langzaam het melken.

Ze geven tot 3-4 liter lekkere melk per dag. Je moet dus al gaan kaas maken om alle melk dagelijks te kunnen verwerken. Heerlijk roomijs, vanille,... Voer ze tijdens het melken wat (erwtstro, graan) bij. Voor wat hoort wat.

De bok kan een sterke geur verspreiden.

♪ *'Ik ben een geit kwijt.'* Ga je een advertentie plaatsen? *'Nee. Ze kan toch niet lezen!'*



Wilde geitachtigen

Geiten zijn holhoornigen (Bovidae) met een uitgebreide wilde familie.

De moeflon (*Ovis orientalis*) is het kleinste wilde schaap en komt voor op Corsica en Sardinië. In Nederland ook op de Hoge Veluwe.

Steenbokken zijn gedrongen geiten met grote, naar achteren gebogen hoorns met ribbels die bij het mannetje de leeftijd weergeven. Er is ook een schedel gevonden in Azewijn, Oost-Gelderland.

Een muskusos is geen os maar een groot schaap. Het is ongeveer 1,40 meter hoog en weegt tot 400 kg. Ze komen voor in Groenland en zijn ingevoerd op Spitsbergen en in Noorwegen.

De gems (*Rupicapra rupicapra*) leeft in hooggebergten en bergbossen en -weiden, en komt in de Lage Landen niet voor.

De gemsbok of spiesbok (*Oryx gazella*) leeft in Zuid Afrika in droge streken zoals de Kalahari en de Namib-woestijn.

Verskil tussen schapen en geiten

Bij de orde van evenhoevigen (Artiodactyla) telt de familie van Holhoornigen (Bovidae) vier geslachtengroepen:

- 🌀 bosgeitantilopen (Nemorhaedini) (o.a. bosgemzen, gorals)
- 🌀 schapen en geiten (Caprini) (o.a. geiten, schapen, thargeiten, manenschaap, blauwschaap)
- 🌀 muskusosachtigen (Ovibovini) (o.a. muskusos, takin)
- 🌀 gemsachtigen (Rupicaprini) (o.a. gemzen, sneeuwgeit en de goral)



Schaap en geit zijn door de mens gedomesticeerde kuddedieren met holle hoorns, die bij het mannetje groter zijn ≡

Het schaap (📖 Ovis aries) verschilt van zijn naaste familielid de geit (📖 Capra hircus)

- 🌀 geiten hebben een sik, schapen niet
- 🌀 geiten hebben sterke geurklieren, schapen niet
- 🌀 een volwassen geitenbok heeft rechte of licht gebogen hoorns, een ram bij schapen heeft hoorns die achter de oren omlaag krullen
- 🌀 bij geiten kan de staart rechtop staan
- 🌀 geiten hebben hier meestal haar i.p.v. wol. Een angorageit heeft veel wol en lijkt op een schaap. En het Kameroenschaap lijkt juist op een geit. Dus de vacht geeft geen uitsluitel
- 🌀 geiten lijken me minder angstig, en nieuwsgieriger. Ze kunnen beter klimmen, springen en uitbreken
- 🌀 geiten knabbelen liever struiken dan gras
- 🌀 geiten zijn lichter gebouwd, en hebben langere poten
- 🌀 geiten mekkeren en schapen blaten

♪ 'Een bok gekocht? En je hebt geen stal!' 'Hij moet in de slaapkamer.' 'En de stank?'
'Daar zal hij wel aan wennen.'